

## **BÊVITER**

cloridrato de tiamina

## **FORMA FARMACÊUTICA**

Comprimido Revestido

## **APRESENTAÇÃO**

**Linha Farma:** Cartucho contendo 3 blisters de alumínio plástico incolor com 10 comprimidos revestidos cada.

## **USO ORAL**

## **USO ADULTO**

## **CONCENTRAÇÃO**

300 mg de cloridrato de tiamina por comprimido revestido (equivalente a 236,02 mg de tiamina).

## **COMPOSIÇÃO**

### **Cada comprimido revestido contém:**

cloridrato de tiamina.....300 mg\*

Excipiente q.s.p. .... 1 comprimido

(fosfato de cálcio dibásico, povidona, crospovidona, estearato de magnésio, hipromelose, etilcelulose, citrato de trietila, dióxido de titânio, álcool etílico).

\*Equivalente a 236,02 mg de tiamina.

Componente ativo do medicamento <b>BÊVITER</b>	Dose: 1 a 2 com/dia	% IDR (RDC n.º 269/05)		
		Adulto	Gestante	Lactante
<b>TIAMINA</b>	<b>236,02 a 472,04 mg</b>	19.668,33%	16.858,57%	15.734,67%
		a	a	a
		39.336,67%	33.717,14%	31.469,33%

% IDR = Porcentagem em relação à Ingestão Diária Recomendada

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O medicamento BÊVITER é indicado para tratamento de casos já estabelecidos de carência de vitamina B1.

### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O BÊVITER possui vitamina B1 em sua composição e age através da reposição dos níveis desta vitamina no organismo, evitando, desta forma, o desenvolvimento de doenças provocadas pela deficiência de tiamina, como o beribéri e Síndrome de Wernicke-Korsakoff. A vitamina B<sub>1</sub> é indispensável para a produção de energia, crescimento e desenvolvimento normal do organismo, além de participar em diversos processos metabólicos importantes no sistema nervoso, no coração e metabolismo de carboidratos.

### **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

BÊVITER é contraindicado para pessoas alérgicas à tiamina ou aos demais componentes da fórmula.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

#### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Em casos de alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. BÊVITER não deve ser administrado por períodos prolongados em doses superiores as recomendadas.

Não existem advertências específicas quanto ao uso deste medicamento por idosos.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

## INTERAÇÕES

O uso prolongado de diuréticos pode levar ao aumento da excreção da tiamina.

A ingestão concomitante de medicamentos antiácidos, como géis de alumínio ou silicato, pode levar à degradação da tiamina no trato gastrointestinal ou perda desta vitamina através das fezes.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento deve ser guardado dentro da embalagem original. Conservá-lo em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30 °C). Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses, indicado na embalagem.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

O medicamento BÊVITER é apresentado na forma de comprimido revestido liso de coloração branca.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso oral.

Um a dois comprimidos ao dia (cada comprimido contém 300 mg de cloridrato de tiamina, equivalente a 236,02 mg de tiamina).

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar perda do efeito esperado ou mesmo provocar danos à saúde.



**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

Até o momento não foram descritas reações adversas relacionadas com o uso de cloridrato de tiamina por via oral na concentração do BÊVITER.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento.**

### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento não foram relatados casos de superdosagem de cloridrato de tiamina.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS: 1.3841.0048

Farm. Responsável: Tales Vasconcelos de Cortes - CRF/BA nº3745

**NATULAB LABORATÓRIO SA**

Rua H, nº2, Galpão 03 - Urbis II

Santo Antônio de Jesus - Bahia – CEP - 44.574-150

Rua H, Nº 02, GALPÃO III - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA – CEP 44.574.150  
FONE: (0XX) 75- 3311-5555



CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (75) 3311 5555

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 25/11/2015.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**



**Anexo B**

**Histórico de Alteração da Bula**

Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula <sup>21</sup>	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
20/10/2015	0923241/15-9	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	20/10/2015	0923241/15-9	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	20/10/2015	1º submissão no bulário eletrônico	Bulas para o Paciente (VPS)	<b>Bêviter</b> Comprimido Revestido
25/11/2015	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/11/2015	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	25/11/2015	Dizeres Legais	Bulas para o Paciente (VPS)	<b>Bêviter</b> Comprimido Revestido